

VSV ACHTERHOEK OOST

PROTOCOL:

Intermitterend cortonen luisteren durante partu in een laagrisico populatie

- Tijdens de ontsluitingsfase wordt geadviseerd om bij laag risico zwangeren met behulp van een doptone cortonen te luisteren.
- Luister meteen na een contractie met regelmatige tussenpozen (tweemaal per uur) tijdens de ontsluitingsfase, tenminste gedurende 1 minuut.
- Voel minimaal één keer per uur tijdens het luisteren de pols van de cliënte om vergissingen te voorkomen. Voel bij twijfel vaker. Overweeg een vinger saturatiemeter hiervoor te gebruiken.
- Tijdens de uitdrijving wordt na elke wee de harttonen gedurende 15-30 seconden beluisterd.
- Noteer na het luisteren de hartfrequentie, ook of acceleraties of deceleraties hoorbaar zijn.
- Wanneer er een vermoeden is van een afwijkende basishartfrequentie (< 110 BPM), oplopende basishartfrequentie, bradycardie, tachycardie of deceleraties hoorbaar zijn, dan behoren de hierna volgende acties tot beleidsopties:
 - Luister frequenter, afhankelijk van de situatie bijvoorbeeld 3 opeenvolgende contracties.
 - Breng het complete klinische beeld in kaart, denk hierbij o.a. aan de houding van de cliënt, de kracht en frequentie van de contracties en maternale controles.
- Wanneer een afwijkende foetale hartfrequentie is bevestigd of bij enige twijfel, vraag een consult aan (durante partu) of draag de cliënte over aan de dienstdoende gynaecoloog. De foetale conditie zal gedurende (minimaal) 30 minuten geregistreerd worden (consult) of continue bewaakt worden (overdracht) middels cardiotocografie (CTG). Leg aan de cliënte uit waarom dit nodig is.

Bronvermelding

- *Intrapartum care for healthy women and babies*, NICE guideline, december 2014 (updated february 2017)
- *Praktische verloskunde*, M. Prins, J. van Roosmalen,
- *Obstetrie en gynaecologie*, M.J. Heineman, september 2007
- *Mayes midwifery: a textbook for midwives*, Christine Henderson, Sue MacDonald, Bailliere Tindall, 2004
- *Foetale bewaking*, NVOG richtlijn
- *Foetale bewaking*, dr. J. Nijhuis, dr. G. Essed, dr. H. van Geijn, dr. G. Visser, 2013

PROTOCOL:

Intermitterend cortonen luisteren durante partu in een laagrisico populatie 2017